ЛАКТОДЕПАНТОЛ®

NIZHPHARM GROUP

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ **СОБСТВЕННОЙ** МИКРОФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА **ПОСЛЕ ЛЮБОЙ ПРОТИВОМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ**[1,2]

МЕТРОНИДАЗОЛ[2,4]

КОМБИНИРОВАННЫЕ ИНТРАВАГИНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ[7]

АНТИМИКОТИКИ[6]

АНТИСЕПТИКИ[5]

ЛАКТОДЕПАНТОЛ[3]
(100 мг молочной кислоты)



- **СНИЖЕНИЕ** РИСКА РЕЦИДИВОВ[4]
- **ВОССТАНОВЛЕНИЕ** МИКРОФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА ЗА СЧЕТ **СОБСТВЕННЫХ ЛАКТОБАЦИЛЛ**[2]
- **ПОДАВЛЕНИЕ** ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ ЗА СЧЕТ **НОРМАЛИЗАЦИИ pH**[2]

1. Минкина Г.Н. и др., Ренессанс вагинальной микробиоты: Смена клинических парадигм// РМЖ. Мать и дитя. 2022. №4. 2. Kira E. F. et al. Сравнительный анализ эффективности и безопасности параллельного или последовательного сочетания метронидазола с молочной кислотой и двухэтапного метода метронидазол плюс пробиотик. Многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование //Акушерство и гинекология. – 2016. – №. 9. – С. 87-93. 3. ОХЛП Лактодепантол, ЛП-№(000078)-(РГ-RU), 29.09.2020г 4. Летяева О. И. Терапия рецидивирующего бактериального вагиноза: клинико-микробиологические аспекты //Акушерство и гинекология. – 2014. – №. 4. – С. 88-92. 5. Буданов П. В. и др. Эффективное восстановление колонизационной резистентности влагалища: преимущества и ограничения вагинальных лекарственных форм //Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2013. – Т. 12. – №. 2. – С. 72-78. 6. Пестрикова Т.Ю., и др. Персонифицированный подход к диагностике и лечению рецидивирующих форм бактериального вагиноза. Клинический разбор в общей медицине. 2024 7. Н. Ю. Каткова, и др. Неспецифический вагинит: новое о старом // Эффективная фармакотерапия. – 2018. – № 26. – С. 16-19.

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ

Параллельное применение[2]

КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНТРАВАГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ
АНТИМИКОТИК
АНТИСЕПТИК

+

НА НОЧЬ



1 раз в день
10 дней

Последовательное применение[2]

I ЭТАП
КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНТРАВАГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ
АНТИМИКОТИК
АНТИСЕПТИК

II ЭТАП НА НОЧЬ



1 раз в день
10 дней

Противорецидивная схема

I этап — воздействие на микробную биопленку



1 раз в день
5 дней

II этап — подавление патогенной микрофлоры

КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНТРАВАГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ
АНТИМИКОТИК
АНТИСЕПТИК

III этап — восстановление микрофлоры влагалища



1 раз в день
5 дней

АО «Нижфарм», 603105, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, 7
POS-20261128-1976. Декабрь 2024.

Инструкция Лактодепантол®

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ